

## **Hepatita A-C**

### **HEPATITA-A:**

**Numele:** Galbeneala, Infectarea ficatului

**Agent patogen:** Un virus

**Raspindire:** 4-5 Boli/ 100.000 locuitori (1999)

**Transmitere:** Prin contactarea excrementelor sau alimentelor prin care cineva a pus mina pe ele fara sa se spele pe miini dupa folosirea toaletei.

**Manifestare:** Ingalbenirea Pielei, deschiderea excrementelor-inchiderea culoarei urinei, dureri in burta a partii drepte, manifestarea ca, la o gripa:Febra, oboseala greturi.

**Inceput:** 2-6 saptamini de la contact

**Dovada:** Testarea singelui.

**Decurgere:**Insanatosare deplina (citeodata dupa citeva luni)

**Tratament:** Numai Febra si greturile;repaus la pat, menajarea ficatului:Macar un an nu se foloseste alcool. Folosirea pastilelor pt. ficat este interzisa.

**Protejare:** Dupa folosirea toaletei spalarea miinilor, igiena alimentara.

**VACCINARE ESTE POSIBILA: 3INJECTII IMPREUNA CU HEPATITA B.**

### **HEPATITA- B:**

**Numele:** Galbeneala, Infectarea ficatului

**Agent patogen:** Un virus

**Transmitere:** Ca, la SIDA, dar 50 de ori mai usor:Raport sexual fara prezervativsi

Contact cu sange.

**Raspindire:** In toata lumea: 5%-7%= 350.000.000 purtatori (1999)

Germania:250.000- 650.000 purtatori/ 50.000 noi infectati/ AN

**Manifestare:** La fel ca, la Hepatita A numai la 50% bolnavi, dar la ceilalti jumatate nu se cunoaste boala sau la ceilalti afectati se simt oboseiti.

**Inceput:** 2-26 saptamini de la contact

**Dovada:** Testarea singelui.

**Decurgere:** 95%-97% insanatosire la adulti.

La 3%-5% ramina microbii o viata intreaga in corp(cronic) si persoanele infectate pot sa ii inbolnaveasca pe ceilalti prin un raport sexual fara prezervativ sau prin contactarea singelui. La jumatate din persoanele bolnave cronic poate dupa 10-20 de ani a se manifesta,distrugerea ficatului sau cancer la ficat care ajunge la moartea bolnavului.

**Tratament:** Ca la Hepatita A; plus controlare daca boala devine cronic; atunci daca continua mai mult de jumatate de an.

**Protejare:** Folosirea prezervativelor si personalele seringi.

**TREI VACCINARI (impreuna cu Hepatita A). VA DA O PROTEJARE DE 5 ANI.**

## HEPATITA- C:

**Numele:** Infectarea ficatului

**Agent patogen:** Un virus

**Transmitere:** Inca nu se stie precis: 70% s-au infectat prin contactarea singelui (imprumutarea acului de siringa). La cealalta jumătate nu se stie prin ce s-au infectat. O transmitere prin un raport sexual fara prezervativ este m-ai greu ca, la Hepatita B dar nu este imposibil ( aproape 10% presupun)

**Manifestare:** Nu se vede: s-ar putea oboseala.

**Inceput:** 2-4 luni de la contact.

**Dovada:** Testarea singelui.

**Decurgere:** La aproape 40 % boala se manifesta cronic; nu se trateaza de aceea bolnavii pot alte persoane infecta. Pt. ficatul este (40%) bolnav nu se consuma alcool si multe pastile. La jumătate (30 - 40 % ) din acesti oameni ca si la Hepatita B dupa 10-20 de ani se poate ajunge la istrugerea ficatului si pina la moarte.

**Tretament:** Menajarea ficatului sta pe primul loc ( nu se consuma alcool s pastile pt. ficat). Daca dupa jumătate de an nu se vindeca, se poate ca, si la Hepatita B se face la ficat un control, un tratament cu Interferon se probeaza. Chiar si edicamentele de la SIDA - o terapie se probeaza; Dar succesul a ajutat numai 70% din tratati.

**Cazuri de decces:** 4000 cazui de moarte/ (1999)

**Protejare:** UN VACCIN NU ESTE POSIBIL.

SE ACEEA: RAPORT SEXUAL PROTEJAT SI PROPRIILE SIRINGI  
LA CONSUMAREA DROGURILOR.

LA HEPATITA CUM SI LA SIDA NU SE POATE VEDEA BOALA LA OAMENI DE ACEEA LA FIECARE CLIENT VA PUTETI MOLIPSI. DE ACEEA FIECAR FEMEIE SA SE PROTEJEZE. CHIAI SI LA "CLIENTI VECHI". CEL M-AI USOR ESTE SA VA INFECTATI DE LA PRIMUL CONTACT SI MANIFESTAREA ESTE DE LA 2 SAPTAMINI PINA LA 6 LUNI.